


**PROTOCOLE REGIONAL  
SMUR URGENCES  
2012/2013**

**PRISE EN CHARGE DU SYNDROME  
CORONARIEN AIGU  
REGION PICARDIE**


**COLLEGE DE MEDECINE D'URGENCE DE PICARDIE  
CHU AMIENS / SAS CARDIOLOGIE ETC ...**

# LE SCA ST +



\*PCM : PREMIER CONTACT MEDICAL \*\* CENTRE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNEL

# LE SCA ST -



UDT\*\*\* : Unité Douleur Thoracique

## LES CONTRE-INDICATIONS ABSOLUES

1. **KARDEGIC®** : ulcère gastroduodéal en évolution, hypersensibilité, maladie hémorragique constitutionnelle, grossesse > à 6 mois, Méthotrexate >15 mg/semaine
2. **MORPHINE** : insuffisance respiratoire décompensée, insuffisance hépatocellulaire sévère, traumatisme crânien, hypertension intracrânienne, épilepsie non contrôlée, buprénorphine, nalbuphine, pentazocine
3. **RISORDAN®** : hypersensibilité  
**REMARQUE** : l'utilisation du RISODAN® pendant un IDM à la phase aiguë siégeant dans le territoire inférieur avec extension au ventricule droit est une contre-indication relative
4. **PLAVIX®** : hypersensibilité, insuffisance hépatocellulaire sévère, lésion hémorragique évolutive telle qu'un ulcère gastroduodéal ou une hémorragie intracrânienne, allaitement
5. **LOVENOX®** : hypersensibilité, antécédents de TIH, manifestations ou tendances hémorragiques liées à des troubles de l'hémostase, lésions organiques susceptibles de saigner, saignement évolutif cliniquement significatif, enfant de moins de 3 ans, hémorragie intracérébrale, insuffisance rénale sévère, anesthésie péridurale ou rachianesthésie (traitement curatif)
6. **EFIENT®** : hypersensibilité, saignement pathologique avéré, antécédent AVC ou AIT, insuffisance hépatocellulaire sévère
7. **Héparine Non Fractionnée** : hypersensibilité, antécédents de TIH, lésions organiques susceptibles de saigner, maladies hémorragiques constitutionnelles, manifestations ou tendances hémorragiques liées à des troubles de l'hémostase, enfant de moins de 3 ans, hémorragie intracérébrale, anesthésie péridurale ou rachianesthésie
8. **METALYSE®** : accidents hémorragiques significatifs, actuels ou au cours des 6 derniers mois, AVK, tout antécédent de lésion du système nerveux central, diathèse hémorragique connue, HTA non contrôlée, intervention chirurgicale majeure inférieure à 2 mois ou traumatisme sévère, traumatisme crânien récent, réanimation cardio-pulmonaire inférieure à 15 jours, pancréatite aigue, insuffisance hépatocellulaire sévère, ulcère gastroduodéal évolutif, anévrisme ou malformation artériel, néoplasie avec risque hémorragique, tout accident vasculaire cérébral, démence, hypersensibilité
9. **BRILIQUE®** : hypersensibilité, saignement pathologique en cours, antécédent d'hémorragie intracrânienne, insuffisance hépatique modérée à sévère, association inhibiteurs du CYP 3A4 (par exemple kétoconazole®, clarithromycine®, néfazodone®, ritonavir®, atazanavir®)
10. **ANGIOX®** : Hypersensibilité, saignement actif ou risque accru de saignement en raison de troubles de l'hémostase et/ou de troubles irréversibles de la coagulation. hypertension sévère non contrôlée, endocardite bactérienne subaiguë. insuffisance rénale sévère (TFG < 30 ml/min), ainsi que patients sous dialyse.

### Score TIMI ST-

ITEMS	POINTS
Age > 65 ans	1 point
> 3 Facteurs de risque vasculaires	1 point
Cardiopathie ischémique connue	1 point
Modification ST > 0.5 mm	1 point
Angor sévère	1 point
Aspirine au cours des 7 derniers jours	1 point
Augmentation Troponine	1 point

Score de GRACE : <http://urgences-serveur.fr/score-grace-sca-non-st,1959.html>